

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP.-9-4-62 100664

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

(SEINE, SEINE & OISE, SEINE & MARNE, EURE-&-LOIR, EURE, OISE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 31, quai Voltaire, PARIS-7° - BAB. 48-38

C. C. P. PARIS 9063-96

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

Bulletin N° 19

Supplément N° 1

7 Avril 1962

AVERTISSEMENTS

TAVELURE DU POIRIER

CULTURES FRUITIÈRES

A la faveur des pluies de fin mars, début avril, les périthèces arrivent à maturité.

Des projections d'ascospores se produiront avec les prochaines pluies. Toutefois en raison des températures actuelles, les contaminations ne seraient à craindre que si le feuillage restait mouillé très longtemps. Un réchauffement favoriserait bien entendu ces contaminations; il semble que pour les prochains jours il faille s'attendre à un temps moins pluvieux avec relèvement des températures maxima, mais par contre avec minima moins élevés.

En conséquence, dès que le temps (vent en particulier) et l'état du sol de certains vergers le permettront, il conviendra d'effectuer un premier traitement sur les poiriers ayant atteint ou dépassé le stade C3 - D. Les variétés tardives seront traitées dès l'apparition de ce dernier stade.

TAVELURE DU POMMIER

La maturation des périthèces est moins avancée. Toutefois des pluies de l'ordre d'une dizaine d'heures pourront assurer des projections, et si elles se poursuivent les premières contaminations.

Un traitement ne semble donc se justifier sur les variétés hâtives ayant dépassé le stade C3 que

- dans le cas d'humidité très prolongée avec les températures actuelles
- dans le cas de pluies de moins longue durée mais avec réchauffement.

CECIDOMYIE DES POIRETTES

Les sorties d'adultes se poursuivent malgré les températures basses. Toutefois elles restent faibles.

MONILIA DE L'ABRICOTIER

Après un deuxième traitement réalisé au stade bouton rose (voir bulletin n° 17) un troisième traitement devra être effectué à la chute des collerettes.

REMARQUE : Pour les Tavelures du Poirier et du Pommier, utiliser de préférence un produit cuprique avant floraison.

L'INGENIEUR et L'AGENT TECHNIQUE
CHARGES DES AVERTISSEMENTS AGRICOLES,
H. SIMON et R. MERLING.

L'INSPECTEUR
de la PROTECTION DES VEGETAUX
G. BERGER.

Imprimerie de la Station de l'Ile de France - Directeur-Gérant: L. Bouyx.
31, Quai Voltaire - Paris- (7°).

P 36